

DE CE MAQS?

EFICIENTA RIDICATA

MAQS are o eficienta medie de **90-99%** omoarand parazitii si in celulele capacite

NU LASA REZIDUURI

Tratamentul se poate face si in timpul culesului, MAQS nu lasa urme in ceara sau miere.

GATA DE FOLOSIRE

MAQS este gata de folosire la scoaterea din cutie.

NATURAL

MAQS este fabricat din materii prime naturale.

BIODEGRADABIL

Benzile MAQS sunt facute integral din materiale naturale biodegradabile care pot fi ulterior compostate.

OPTIUNE RAPIDA

Tratamentul cu MAQS consta intr-un tratament de 7 zile. Benzile nu necesita sa fie indepartate dupa tratament.

FARA REZISTENTA

Acidul Formic este folosit de mai bine de 30 de ani in apicultura, fara a dezvolta inca vre-o rezistenta.

De unde se poate cumpara?

DISTRIBUIT IN ROMANIA:

FERMA APICOLA MERISANI

SC UNICUB GRUP SRL.

Magurele - Ilfov

www.fermaapicola.ro

office@fermaapicola.ro

Tel: +40 745383789 / +40 312263853



MAQS®

BENZI CU ACID FORMIC
PENTRU STUPI

TRATAMENTUL VAROOZEI

CAUZATA DE VARROA

DESTRUCTOR LA ALBINELE

MELIFERE (*APIS MELLIFERA*)



PENTRU SUPORT
PRODUCATOR:
+1 613 398 8422
info@nodeurope.eu
Pentru a afla mai multe, viziteaza:
www.NODEUROPE.eu


Albine sanatoase
=
Planeta Sanatoasa



CELE MAI BUNE PRACTICI DE MANAGEMENT



MONITORIZAREA PARAZITILOR LUNAR

Parazitii pot foarte repede sa copleseasca si sa omoare coloniile de albine daca nu sunt monitorizate si tratate din timp de-a lungul sezonului apicol.

Coloniile puternic infestate sufera de paraziti si bolile transmise de Varroa, lucru ce poate duce la colapsul coloniei.

HRANESTE - RATEAZA - DIVIDE

Coloniile hranite bine suporta mult mai usor tratamentul. Coloniile trebuie hranite foarte bine inainte de administrarea tratamentului si nu se hranesc in timpul tratamentului.

Cel mai eficient este sa se aplică tratamentul in faza de dezvoltare a coloniei (primavara), inainte de divizarea pentru crearea de roi.

ALBINELE SUNT INSECTE SOCIALE - SE VA LUA CONSIDERARE REINFESTAREA

Coloniile puternic infestate, coloniile slabe sau cele salbatice, pot fi atacate (furtisag) de catre familiile sanatoase si puternice, in special toamna, acest lucru conducand la o reinfestare cu Varroa a coloniilor, uneori la niveluri alarmante.

SE VOR CITI SI RESPECTA INDICATIILE DE PE ETICHETA

PARAZITII VARROA & VARIATIILE SEZONIERE ALE COLONIILOR DE ALBINE




De la inceputul sezonului, este extrem de necesar sa se monitorizeze lunar nivelul de infestare cu paraziti, in perioada de prezenta a puietului si sa se intervina local unde se observa incarcari excesive.

Se va trata in perioada de CRESTERE A POPULATIEI pentru a se proteja colonia de albine ce se indreapta spre culesurile principale.

Se va trata in perioada de SCADERE A POPULATIEI, pentru a se proteja albinele ce vor forma ghemul de iernat.

Lipsa unui tratament poate duce la cresteri excesive de paraziti, necesitand apoi mai multe tratamente.



7 ZILE DE TRATAMENT

2 BENZI - (DOZA COMPLETA)

TEMPERATURA

10 - 29.5°C

VENTILATIA

URDINISUL VA FI DESCHIS LA MAXIM PE TOATA DURATA TRATAMENTULUI, PE TOATA LATIMEA STUPULUI SI CU O INALTIE DE MINIM 1,3 CM

ALBINELE ADUC AER PROASPAT PE URDINIS ASIGURAT-VA CA URDINUSUL NU ESTE BLOCAT. ALTERNATIV SE POATE DESCHIDE FUNDUL ANTI-VARROA SAU O FANTA DE VENTILATIE IN PODISOR, DE APROX. 4 CM.