

Advocate

soluție spot-on pentru câini

Compoziție

Fiecare doză (pipetă) de Advocate soluție spot-on pentru câini conține:

	Doza (pipetă)	Imidacloprid	Moxidectin
Advocate pentru câini de talie mică (≤ 4 kg)	0,4 ml	40 mg	10 mg
Advocate pentru câini de talie mijlocie ($> 4-10$ kg)	1,0 ml	100 mg	25 mg
Advocate pentru câini de talie mare ($> 10-25$ kg)	2,5 ml	250 mg	62,5 mg
Advocate pentru câini de talie foarte mare ($> 25-40$ kg)	4,0 ml	400 mg	100 mg

Excipienți: alcool benzilic, 1 mg/ml hidroxibutiltoluen (E321: ca antioxidant)

Indicații

La câini infestați sau expuși riscului de infestare cu mai multe tipuri de paraziți, pentru tratarea și prevenirea infestației cu purici (*Ctenocephalides felis*), tratamentul infestațiilor cu păduchi malofagi (*Trichodectes canis*), tratarea râiei auriculare (*Otodectes cynotis*), râiei sarcoptice (determinată de *Sarcoptes scabiei* var. *canis*), demodecia (determinată de *Demodex canis*), prevenirea dirofilariozei cardiace (larve L3 și L4 de *Dirofilaria immitis*) și angiostrongilii (larve L4 și adulți imaturi de *Angiostrongylus vasorum*) tratamentul infestării cu *Angiostrongylus vasorum* și *Crenosoma vulpis* tratarea infestațiilor cu nematode gastrointestinale (larve L4, adulți imaturi și adulți de *Toxocara canis*, *Ancylostoma caninum* și *Uncinaria stenocephala*, adulți de *Toxascaris leonina* și *Trichuris vulpis*). Produsul poate fi utilizat concomitent cu medicația specifică în cazul dermatitei alergice provocată de purici (FAD).

Contraindicații

Nu se utilizează la căței mai mici de 7 săptămâni. Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanțele active sau la oricare dintre excipienți. Siguranța produsului medicinal veterinar nu a fost stabilită pe durata gestației și lactației. Studiile de laborator efectuate pe șobolani și iepuri cu imidacloprid sau moxidectin nu au demonstrat efecte teratogene, fetotoxice sau materno-toxice. Se utilizează numai în conformitate cu evaluarea beneficiu risc de către medicul veterinar responsabil. La pisici se va utiliza produsul -Advocate pentru pisici care conține 100 mg/ml imidacloprid și 10 mg/ml moxidectin. Pentru dihori: A nu se utiliza Advocate soluție spot-on pentru câini. Se va utiliza doar „Advocate pentru pisici de talie mică și dihoril (0,4 ml).

Reacții adverse

Produsul poate determina un prurit pasager la câini. Rar s-au semnalat o blană unsuroasă, eritem și vomă. Aceste semne dispar fără tratament. În cazuri rare produsul poate determina reacții locale de hipersensibilitate. Dacă animalul linge locul de aplicare după tratament, se pot semnala uneori semne neurologice pasagere cum ar fi ataxie, tremurături generalizate, semne oculare (pupile dilatate, reflex pupilar scăzut, nistagmus), respirație anormală, salivație și vomă. Produsul are gust amar. Ocazional, poate să apară salivație dacă animalul linge zona de aplicare imediat după tratament. Acesta nu este un semn de intoxicație și dispare în câteva minute fără tratament. Aplicarea corectă va minimaliza lingerea locului de aplicare. În caz de ingerare orală accidentală, se va administra tratament simptomatic de către un medic veterinar. Nu există antidot specific. Poate fi beneficiă administrarea de cărbune activat. În cazuri rare produsul poate determina la locul de aplicare apariția unor senzații care modifică comportamentul, letargie, agitație și inapetență. Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

Specii țintă

Câini.

Posologie pentru fiecare specie, cale de administrare și mod de administrare

Doar pentru uz extern.

Locul optim de aplicare este între spete, pe partea dorsală a corpului.

Schema de dozare:

Dozele minime recomandate sunt 10 mg/kg greutate vie imidacloprid și 2,5 mg/kg greutate vie moxidectin, echivalent cu 0,1 ml/kg greutate vie Advocate soluție spot-on pentru câini.

Schema de tratament este în funcție de situația epidemiologică locală.

Greutatea câinelui [kg]	Tipul de pipetă utilizat	Volum [ml]	Imidacloprid [mg/kg g.v.]	Moxidectin [mg/kg g.v.]
≤ 4 kg	Advocate pentru câini de talie mică	0,4	minim 10	minim 2,5
$> 4 - 10$ kg	Advocate pentru câini de talie mijlocie	1,0	10 - 25	2,5 - 6,25
$> 10 - 25$ kg	Advocate pentru câini de talie mare	2,5	10 - 25	2,5 - 6,25
$> 25 - 40$ kg	Advocate pentru câini de talie foarte mare	4,0	10 - 16	2,5 - 4
> 40 kg	Combinăția corespunzătoare de pipete			

Tratament și prevenirea infestației cu purici

Un tratament previne infestația cu purici timp de 4 săptămâni. Pulele din mediul înconjurător pot ecloziona timp de 6 luni sau o perioadă mai lungă după inițierea tratamentului, în funcție de condițiile climatice. De aceea uneori este necesar ca tratamentul cu Advocate soluție spot-on pentru câini să fie însoțit de dezinsecții ale mediului înconjurător pentru întreruperea ciclului de viață al puricilor prezenți aici. Rezultatul va fi reducerea mai rapidă a puricilor din zona unde trăiește animalul tratat. Produsul trebuie administrat la intervale de o lună în scopul prevenirii apariției dermatitei alergice provocată de purici.

Tratamentul infestațiilor cupăduchimalofași (Trichodectes canis)

Se administrează o singură doză. După 30 de zile de tratament este necesară o nouă examinare efectuată de medicul veterinar iar la unele animale este recomandat un al doilea tratament.

Tratament în raia auriculară (Otodectes cynotis)

Se administrează o singură doză. Detritusurile desprinse din canalul auricular extern ar trebui să fie ușor eliminate la fiecare tratament. După 30 de zile se recomandă un examen clinic veterinar deoarece la unele animale este nevoie de încă o aplicare. Nu se aplică direct în canalul auricular.

Tratament în rîiasarcoptică (determinată de Sarcoptes scabiei var. canis)

Câte o singură doză trebuie administrată de două ori la interval de 4 săptămâni.

Tratamentul în demodecie (determinat de Demodex canis)

Administrarea unei singure doze la fiecare 4 săptămâni timp de 2 până la 4 luni, este eficace împotriva *Demodex canis* și marchează o îmbunătățire a semnelor clinice în special în cazurile ușoare și moderate. Cazurile severe, în special, pot necesita un tratament de lungă durată și cu o frecvență mai ridicată. Pentru a se ajunge la cele mai bune rezultate în cazurile severe și la recomandarea medicului veterinar, Advocate soluție spot-on pentru câini poate fi aplicat o dată pe săptămână pe o perioadă mai lungă de timp. În toate cazurile este esențial ca tratamentul să fie continuat până când raclatul cutanat este negativ cel puțin de 2 ori consecutiv, raclatul efectuat la interval de o lună. Tratamentul trebuie întrerupt la câinii care nu au arătat nici o îmbunătățire sau care nu au nici un răspuns la numărarea parazitului după 2 luni de tratament. Trebuie să fie administrat tratament alternativ. Solicitați sfatul medicului veterinar.

Cum demodecia este o boala determinată de mai mulți factori, se recomandă și tratarea bolilor asociate.

Prevenirea dirofilariozei cardiovasculare

Câini care trăiesc în zone endemice de dirofilarioză cardiovasculară sau cei care au călătorit în astfel de zone, pot fi infestați cu dirofilarii adulte. De aceea, înainte de tratamentul cu Advocate soluție spot-on pentru câini, se va lua în considerare recomandarea făcută la secțiunea „ATENȚIONARE SPECIALĂ”

Pentru prevenirea dirofilariozei cardiovasculare, produsul se va aplica la intervale lunare regulate în perioada anului când sunt prezenți țânțarii (gazde intermediare care transmit larvele de dirofilarii). Produsul poate fi administrat pe toată perioada anului sau cu cel puțin o lună înainte de prima expunere la țânțari. Tratamentul trebuie continuat la intervale lunare regulate inclusiv timp de o lună de la ultima expunere la țânțari. Pentru a stabili o rutină a tratamentului se recomandă ca aplicarea să se facă în aceeași zi sau dată din lună. În cadrul programului de prevenire a dirofilariozei cardiovasculare, dacă Advocate soluție spot-on pentru câini înlocuiește un alt produs, prima administrare de Advocate soluție spot-on pentru câini va fi făcută în intervalul de o lună de la aplicarea acelui produs. În zonele non-endemice, nu ar trebui să existe riscul de infestare cu dirofilarioză cardiacă la câine. De aceea câini pot fi tratați fără a se lua măsuri speciale de precauție.

Tratamentul și prevenirea infestațiilor cu Angiostrongylus vasorum

Se administrează o singură doză. După 30 de zile de tratament este necesară o nouă examinare efectuată de medicul veterinar iar la unele animale este recomandat un al doilea tratament.

În zonele endemice administrarea regulată la fiecare 4 săptămâni va preveni infestarea cu Angiostrongylus vasorum.

Tratament în infestații Crenosoma vulpis

Se va administra o singură doză.


Tratament în infestații cu nematode și ancilostomatide

În zonele endemice de dirofilarioză cardiovasculară, tratamentele lunare pot reduce semnificativ riscul reinfestării cu nematode și ancilostomatide. În zonele non-endemice de dirofilarioză cardiovasculară, produsul poate fi folosit în programul sezonier de prevenire contra puricilor și nematodelor gastrointestinale.

Studiile au arătat că tratamentul lunar al câinilor previne infestarea determinată de *Uncinaria stenocephala*.


Recomandări privind administrarea corectă

Scoateți o pipetă din pachet. Țineți pipeta în poziție verticală, răsucați și scoateți capacul. Întoarceți capacul invers și cu ajutorul lui desigilați pipeta prin răsucire și apăsați asupra sigiliului, ca în fotografie.




Pentru câine până la 25 kg: La câinele așezat în poziție șezută, se îndepărtează blana dintre spete astfel încât pielea să fie vizibilă. Aplicați numai pe piele sănătoasă. Plasați vârful pipetei pe piele și strângeți pipeta ferm de câteva ori pentru a golii conținutul direct pe piele.

Pentru câini mai mari de 25 kg:



Pentru o aplicare ușoară câinele va fi așezat în poziție șezută. Întregul conținut al pipetei trebuie aplicat în 3-4 puncte în lungul coloanei vertebrale de la umeri la baza cozii. Pentru fiecare punct îndepărtați blana astfel încât pielea să fie vizibilă. Aplicați numai pe piele sănătoasă. Plasați vârful pipetei pe piele și strângeți pipeta ferm de câteva ori pentru a goli conținutul direct pe piele. Nu aplicați o cantitate mare de soluție într-un singur punct pentru a împiedica scurgerea pe părțile laterale ale animalului.



Timp de așteptare

Nu este cazul.

Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor. A nu se păstra la temperatura mai mare de 30°C. A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă și cutie

Atenționare specială

Conținutul pipetei sau doza aplicată nu trebuie să vină în contact cu ochii sau gura animalului tratat și/sau a altor animale. Nu permiteți animalelor tratate recent să se lingă reciproc. Când produsul este aplicat în 3-4 puncte atenție specială trebuie acordată pentru a preveni linsul zonelor pe care a fost aplicat produsul. Acest produs conține moxidectin (lactonă macrociclică) astfel atenție deosebită ar trebui acordată la câinii din rasele Collie, Ciobănesc englez și metișii acestora prin administrarea produsului cum este menționat în „RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ” în particular, atenție în prevenirea ingestiei ambalajului de către animale și/sau contactul cu alte animale trebuie de asemenea evitat. Deși produsul poate fi utilizat la câinii care sunt infestați cu dirofilarii adulte, nu are acțiune terapeutică asupra adulților de *Dirofilaria immitis*. Se recomandă testarea câinilor peste 6 luni de viață sau mai mari care trăiesc în zone în care dirofilarioză cardiacă este endemică, pentru existența adulților de *Dirofilaria*, înainte de începerea utilizării acestui produs. Tratarea animalelor mai mici de un kg se va baza pe o evaluare atentă a raportului risc/beneficiu. Există o experiență limitată în ceea ce privește utilizarea produsului la animale bolnave și debile de aceea, produsul va fi utilizat numai pe baza unei evaluări atente a raportului risc/beneficiu. Contactul de scurtă durată al animalului cu apă, o dată sau de două ori între tratamentele lunare, este puțin probabil să reducă eficacitatea produsului. Totuși, șamponarea sau scufundarea frecventă în apă a animalului după tratament, poate reduce eficacitatea produsului. Advocate soluție spot-on pentru câini nu trebuie deversat în cursuri de apă, datorită efectelor nocive asupra organismelor acvatice: moxidectinul este foarte toxic pentru organismele acvatice. Câini nu trebuie să înoate în apele de suprafață timp de 4 zile după tratament.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul la animale

Evitați contactul cu pielea, ochii sau gura. Nu mâncați, nu beți, nu fumați în timpul aplicării produsului. Spălați bine mâinile după aplicarea produsului. După aplicare nu periați sau mângâiați animalul decât după uscarea zonei de aplicare. Dacă produsul ajunge accidental pe piele spălați imediat zona cu săpun și apă. Persoanele sensibile la alcool benzilic, imidacloprid sau moxidectin vor administra produsul cu mare atenție. În cazuri foarte rare produsul poate determina sensibilizarea pielii sau reacții cutanate tranzitorii. (de exemplu alergii, iritații sau furnicături). Dacă produsul ajunge accidental în ochi, spălați ochii cu multă apă. Dacă simptomele cutanate sau oculare persistă, sau produsul este înghițit accidental, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului. Solventul din **Advocate soluție spot-on pentru câini** poate păta sau deteriora anumite materiale cum ar fi pielea, țesături, plastic și suprafețe finite. Lăsați locul de aplicare să se usuce înainte de contactul cu astfel de materiale.

Precauții speciale pentru eliminarea produselor neutilizate sau a deșeurilor, după caz

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului

Alte informații

Imidacloprid este eficient față de puricii adulți și stadiile larvare ale puricilor. Larvele de purici din mediul înconjurător animalelor de casă sunt omorâte după ce intra în contact cu un animal de casă tratat cu acest produs.

Rezistența paraziților la orice clasă de antihelmintice se poate instala după utilizarea frecventă și repetată a unui antihelmintic dintr-o anumită clasă.

Mărimea ambalajului: 0,4 ml, 1,0 ml, 2,5 ml și 4,0 ml pe pipetă; blister cu 3, 4, 6, 21 sau 42 pipete în doză unică.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.

Deținătorul Autorizației de Comercializare

Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Germania.