

FORESTO

1,25 g+ 0,56 g zgardă antiparazitară pentru pisici și câini ≤ 8 kg

Denumirea produsului medical veterinar

Seresto 1.25 g+ 0.56 g collar for dogs ≤ 8 kg

Foresto 1.25 g+ 0.56 g zgarda antiparazitara ≤ 8 kg

Imidacloprid

Flumetrin

Declararea substanțelor active și a altor ingrediente

O zgardă de culoare gri, fără miros de 38 cm (12.5 g) conține 1.25 imidacloprid și 0.56 flumetrin ca substanțe active

Excipienti: Dioxid de titan (E171), oxid de fier (E172), dibutiladipat, propilen glicoldicaprilocarprat, ulei de soia expoxidizat, acid stearic, policlorură de vinil.

Indicații

Pisici:

Pentru tratamentul și prevenirea infestării cu purici (*Ctenocephalides felis*) de până la 8 luni. Eficacitatea împotriva puricilor începe imediat după aplicarea zgârzii.

Protejează împrejurimile animalului împotriva dezvoltării larvelor de purici până la 10 săptămâni. Foresto poate fi utilizat ca parte a unei strategii de tratament pentru combaterea dermatitei alergice provocată de purici (FAD).

Produsul are efect acarcid (ucidere) de durată, (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus turanicus*) și repellent (anti-hrânire) eficacitatea împotriva infestărilor cu căpușe (*Ixodes ricinus*) este de 8 luni. Este eficient împotriva larvelor, nimfelor și căpușelor adulte.

Căpușele deja prezente pe câine înainte de tratament nu pot fi ucise în 48 de ore după aplicarea zgârzii și pot rămâne atașate și vizibile. Prin urmare, îndepărtarea căpușelor deja prezente pe pisică, la momentul aplicării zgârzii este recomandat. Prevenirea infestațiilor cu noi căpușe începe în două zile după aplicarea zgârzii.

Ideal, această zgradă antiparazitară trebuie să fie aplicată înainte de începutul sezonului cu purici și căpușe.

Câini:

Pentru tratamentul și prevenirea infestării cu purici (*Ctenocephalides felis*) timp de până la 8 luni. Eficacitatea împotriva puricilor începe imediat după aplicarea zgârzii.

Protejează împrejurimile animalului împotriva dezvoltării larvelor de purici până la 8 luni. Foresto poate fi utilizat ca parte a unei strategii de tratament pentru combaterea dermatitei alergice provocată de purici (FAD).

Produsul are efect acarcid (ucidere) de durată, eficacitatea împotriva infestărilor cu căpușe (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor reticulatus*) și eficacitate repellentă (anti-hrânire) împotriva infestărilor cu căpușe (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) pentru 8 luni. Este eficient împotriva larvelor, nimfelor și căpușelor adulte.

Căpușele deja prezente pe câine înainte de tratament nu pot fi ucise în 48 de ore după aplicarea zgârzii și pot rămâne atașate și vizibile. Prin urmare, îndepărtarea căpușelor deja prezente pe câine, la momentul aplicării zgârzii este recomandat. Prevenirea infestațiilor cu noi căpușe începe în două zile după aplicarea zgârzii.

Pentru tratamentul infestărilor cu păduchi malofagi (*Trichodectes canis*).

Ideal, această zgradă antiparazitară trebuie să fie aplicată înainte de începutul sezonului cu purici și căpușe.

Contraindicații

Nu se vor trata pisoi cu vîrstă mai mică de 10 săptămâni și cățeii cu vîrstă mai mică de 7 săptămâni.

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate cunoscută la substanțele active sau la oricare dintre excipienti.

Reacții adverse

Ocazional ușor prurit și/sau eritem pot fi observate la animalele care nu sunt obișnuite în a purta zgardă în primele zile după aplicare. Asigurați-vă că zgarda nu este fixată prea strâns. La locul de aplicare poate să apară o ușoară cădere a părului și reacții ușoare ale pielii care dispar, de obicei, în decurs de 1 până la 2 săptămâni fără a fi necesară îndepărtarea zgârzii. În cazuri izolate, o eliminare temporară a zgârzii poate fi recomandată, până când simptomele au dispărut.

La pisici în cazuri rare poate apărea inițial reacții ușoare și tranzitorii ca depresie, schimbări în consumul hranei, salvărie, vărsături și diaree. Ca și în cazul altor aplicații externe la animalele hipersensibile poate să apară dermatită alergică la contact.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm să informați medicul veterinar.

Specii țintă

Pisici, câini ≤ 8 kg

Posologie pentru fiecare specie, cale de administrare și mod de administrare.


Pisicile și câinii de talie mică cu greutate corporală de până la 8 kg primesc o zgardă cu lungimea de 38 cm.

Câinii peste 8 kg primesc o zgardă Foresto antiparazitară pentru câini > 8 kg cu lungimea de 70 cm.

Aplicare cutanată. O zgardă pentru fiecare animal, se fixează în jurul gâtului. Numai pentru uz extern.

Recomandări privind administrarea corectă.

Zgarda se scoate din punga de protecție doar înainte de utilizare. Se desface zgarda și se verifică dacă nu au rămas resturi de plastic pe partea interioară a zgârzii. Se fixează zgarda în jurul gâtului animalului fără a se strânge prea tare (ca un ghid ar trebui să fie posibilă inserarea a 2 degete între zgardă și gâtul animalului). Se trage partea liberă prin cataramă și se taie orice lungime în exces care depășește 2 cm.



Zgarda trebuie să fie purtată continuu pe toată perioada de protecție de 8 luni și trebuie să fie îndepărtată după perioada de tratament.

Verificați periodic și ajustați zgarda dacă este necesar, mai ales atunci când pisoi/cățeii sunt în creștere rapidă.

Această zgardă este proiectată cu un mecanism de închidere cu siguranță. În cazul puțin probabil ca o pisică să fie prinsă, puterea proprie a pisicii este suficientă pentru a lărgi zgarda și pentru a permite eliberarea rapidă.

Timp de așteptare

Nu este cazul

Precauții speciale pentru depozitare.

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții speciale de depozitare.

A nu se utilizează după data expirării marcată pe pungă și pe cutie.

Atenționari speciale

Ca regulă căpușele vor fi omorâte și vor cădea de pe zgardă într-un timp de 24 până la 48 de ore după infestare fără să fi avut o masă de sânge. Prezența unei căpușe după aplicare nu este exclusă. Din acest motiv transmiterea de boli infecțioase prin intermediul căpușelor nu poate fi exclusă complet mai ales în cazul în care condițiile sunt nefavorabile.

Ca la toate produsele topice cu acțiune pe termen lung, în perioadele de năpârlire poate conduce la o ușoară și tranzitorie reducere a eficacității prin pierderea părului de care era legată substanța activă din acest produs. Zgarda va completa imediat lipsa de substanță activă, astfel că eficacitatea deplină va fi restabilită, fără un tratament suplimentar sau de înlocuire a zgârzii.

Pentru combaterea eficientă a puricilor în gospodăriile puternic infestate este necesar a se aplica în mediul înconjurător un insectivid adevărat pentru această utilizare.

Produsul este rezistent la apă, rămâne efficient dacă animalul se udă. Cu toate acestea, expunerea prelungită și intensă la apă și șamponarea excesivă ar trebui să fie evitată, deoarece durata de activitate poate fi redusă. Studiile au arătat că șamponarea lunară sau imersia în apă nu surtează în mod semnificativ de 8 luni pentru căpușe după redistribuirea substanțelor active în blană dar eficacitatea produsului față de purici a scăzut treptat, începând cu luna 5.

Studiile de laborator, fie cu flumetrin sau imidacloprid pe şobolani și iepuri nu au produs efecte asupra fertilității sau reproducерii și nu au demonstrat efecte teratogene sau fetotoxică. Cu toate acestea, siguranța produsului medicinal veterinar la specile ţintă nu a fost stabilită în timpul sarcinii și alăptării și prin urmare în absența datelor disponibile, produsul nu este recomandat la pisicile și cățeile care sunt gestante sau care sunt în lactație.

Datorită naturii produsului semen de supradoxozare sunt puțin probabile iar semen de supradoxozare nu sunt așteptate. O supradoxozare prin aplicare a 5 zgârzii în jurul gâtului a fost investigată la pisici și câini adulți pentru o perioadă de 8 luni și la pisoi cu vârstă de 10 săptămâni și la căței cu vârstă de 7 săptămâni pentru o perioadă de 6 luni nu au fost observate reacții adverse în afară de pierderea ușoară a părului și reacții ușoare ale pielii. În cazul puțin probabil ca animalul să ingere zgarda pot să apară simptome gastro-intestinale (de exemplu, scaun moale).

Precauții speciale pentru persoanele care administrează Foresto la animale:

Zgarda se scoate din punga de protecție doar înainte de utilizare.

Asemănător cu orice produs medicinal veterinary, nu permiteți copiilor mici să se joace cu zgarda sau să doarmă în același pat cu proprietarii lor, în special copii.

Persoanele cu sensibilitate cunoscută la ingrediente din zgardă trebuie să evite contactul cu zgarda. Eliminați imediat orice resturi sau bucăți tăiate din zgardă.

Spălați-vă pe mâini cu apă rece după fixarea zgârzii.

Precăutări speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deșeurilor, după caz

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse medicinal veterinare trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Acest produs nu trebuie să fie deversat în cursuri de apă, datorită pericolului pentru pești și alte organism acvatice.

Alte informații

Dimensiunea ambalajului: o zgardă.

Ambele substanțe active sunt eliberate lent și continuu în concentrații scăzute din matricea acestui sistem din polimer de la zgardă spre animal. Ambele substanțe active sunt prezente în blana pisicilor și cainilor la concentrații acaricide/insecticide pe toată perioada de eficacitate. Substanțele active se extind de la locul de contact direct pe întreaga suprafață a pielii. Studiile de supradozare pe speciile țintă de animale și studiile serice cinetice au stabilit că imidaclopridul a ajuns temporar în circulația sistematică în timp ce flumetrina în cea mai mare parte nu a putut fi măsurată. Absorbția orală a ambelor substanțe active nu este relevantă pentru eficacitatea clinică.

Activitatea împotriva puricilor începe imediat după aplicarea zgârzii reducând astfel riscul de boli transmise prin vectori (de exemplu Bartoneloza și infestarea cu tenia *Dipylidium caninum*). În plus față de indicațiile enumerate mai sus a fost demonstrată și activitatea împotriva puricilor *Ctenocephalides canis* și *Pulex irritans*.

Produsul oferă activitate repellentă (anti-hrânire) împotriva căpușelor menționare, prin respingerea paraziților se previne astfel masa de sânge și ajută indirect la reducerea riscului de boli transmise prin vectori la câine. În plus față de indicațiile enumerate mai sus a fost demonstrată la câini activitate împotriva *I. hexagonus*, *I. scapularis* și a speciilor non-europene de *Dermacentor variabilis* și a căpușei paralizante din Australia *I. holocyclus*.

Zgârzile au fost deamenea capabile să ajute la o evoluție favorabilă la infestarea cu Sarcoptes scabiei la caini infestați anterior ducând la o vindecare completă după 3 luni.

Producător
Bayer Animal Health